

گنده خواری (پیکا)

پیکا عبارت است از انحراف غذایی در حیوان که دام هرچه را که در دسترسش باشد می‌خورد. این عارضه می‌تواند در نتیجه کمبود عواملی مانند سدیم ، مس و کبالت باشد. اشتها ی غیر طبیعی در موارد اسیدوز نیز اتفاق می‌افتد. همچنین درد و یا اختلالات عصبی مانند هاری و استونی می‌تواند باعث بروز این مشکل شود.

پیشگیری:

پیشگیری براساس مراعات دقیق بعضی از توصیه‌های غذایی می‌باشد:

1- کلرورسدیم: استفاده از سنگهای لیسیدنی که جهت جلوگیری از مصرف بیش از حد از آنها حتماً می‌بایست دور از منبع آب قرار گیرند.

2- مس: اضافه نمودن مکملهای حاوی مس به میزان 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک برای گاوها

3- کبالت: میران توصیه شده برای آن عبارت است از 0/1 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک

درمان:

اگر علت بوجود آمدن پیکا، کمبود مس و یا کبالت باشد می‌توان از ترکیباتی که حاوی این عناصر هستند استفاده نمود.

اگر علت بوجود آمدن پیکا، کمبود سدیم باشد، درمان براساس تامین نمک غذا است.

اگر علت بوجود آمدن پیکا، دلایل دیگر مانند هاری
و استونی باشد، می‌بایست این عوامل تحت درمان قرار
گیرند.